

ผลของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ป่นเป็น และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดในผลกาแฟสดหลังการเก็บเกี่ยว

Effects of Acidic Electrolyzed Water on Microbial Contamination and Some Bioactive Compounds in Coffee Cherry after Harvest

12 pt Bold
Line spacing: Exactly 14 pt

Wasana Ammatmanee¹, Poompong Chuchouisawan², Angkhana Chuajedton³ and Kanda Whangchai^{1,4,5}

Abstract 14 pt Bold

Effects of acidic electrolyzed water (AEW) concentration and washing time of fresh coffee cherry on the reduction of the microbial contamination and bioactive compound content, including caffeine and chlorogenic acid, were studied. The concentration of AEW was prepared at 50, 100, and 150 ppm and washing time for 15 and 30 min. The results showed that the highest microbial reduction, caffeine, and chlorogenic acid were found at a 150 ppm of AEW concentration for 30 min. The microbial population was 1.33×10^5 CFU/g and bioactive compounds such as caffeine and chlorogenic acid were 2.06 and 2.27 mg/g. In contrast, control treatment was found the highest microbial population at 6.96×10^6 CFU/g but caffeine and chlorogenic acid were 1.20 and 0.48 mg/g. The caffeine and chlorogenic acid in fresh coffee cherry tended to rise with an increase in AEW concentration and washing time. However, AEW treatment had no effects on the total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), and peel color changes (CIE L* a* b*).

Keywords: acidic electrolyzed water, bioactive compounds, coffee cherry

0.5 นิ้ว

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการเพิ่มน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด และระยะเวลาที่ใช้ในการล้างผลกาแฟสด ต่อการลดลงของเชื้อจุลินทรีย์ที่ป่นเป็นและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิด เช่น กาแฟein และกรดคลอโรเจนิกภายในผลกาแฟสด โดยใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 50, 100 และ 150 ppm มาล้างเป็นระยะเวลา 15 และ 30 นาที พบว่า การล้างผลกาแฟสดด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดที่ความเข้มข้น 150 ppm เป็นเวลา 30 นาที สามารถลดปริมาณจุลินทรีย์ และพบปริมาณกาแฟein และกรดคลอโรเจนิกสูงสุด โดยปริมาณจุลินทรีย์ที่พบภายในผลกาแฟสด คือ 1.33×10^5 CFU/g ส่วนปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น กาแฟein และกรดคลอโรเจนิก เท่ากับ 2.06 และ 2.27 มิลลิกรัมต่อกรัม ในขณะที่ชุดควบคุมพบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ป่นเป็นสูงสุดคือ 6.96×10^6 CFU/g แต่พบปริมาณกาแฟein และกรดคลอโรเจนิกมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความเข้มข้นของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดและระยะเวลาในการล้างที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการล้างด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ ปริมาณกรดทั้งหมดที่ให้เท่ากันได้ และการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกผลของกาแฟ (CIE L* a* b*)

คำสำคัญ: น้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด สารออกฤทธิ์ ผลกาแฟสด

0.75 นิ้ว

¹ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

¹ Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200

² ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

² Postharvest Technology Research Center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200

³ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง 50210

³ Department of Biology, Faculty of Science, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100

⁴ ศูนย์วิจัยชีวภาพเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

⁴ Center of Excellence in Bioresources for Agriculture, Industry and Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200

⁵ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรุงเทพฯ 10400

⁵ Postharvest Technology Innovation Center, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Bangkok 10400

10 pt Regular
Line spacing: Exactly 10 pt

จากเมนูการอ้างอิง (References),
แทรกเชิงอ้างอิง (Insert Footnote)

0.75 นิ้ว

คำนำ

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนิดหนึ่งของไทยโดยเฉพาะกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า เป็นกาแฟที่ปลูกบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจากตำบลเทพเศศเจ ซึ่งปลูกบนพื้นที่ตำบลเทพเศศเจ อำเภออยอสเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชื่นทะเบียนสีงั่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นครัวเรื่องหมายของทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจงคุณภาพหรือซึ่งเสียงของสินค้านั้นๆ แต่ปัจจุบันที่พบจากการลงสำรวจพื้นที่ คือระหว่างการเก็บรักษาและกระบวนการผลิตพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของกาแฟ ทำให้ต้องหัววิธีการทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

น้ำอิเล็กโทรไลต์เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในโรงพยาบาล และมีการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ จากศึกษาของ Al-Haq *et al.* (2002) ได้ศึกษาการยับยั้งเชื้อ *Botryosphaeria berengeriana* ซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียในสาลีพันธุ์ La-France โดยทำการปลูกเชื้อลงบริเวณผิวผลไม้และบ่มเป็นเวลา 10 วัน จากนั้นนำไปจุ่มน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที พบว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคลดลง เช่นเดียวกับ Paola *et al.* (2005) ทำการทดลองโดยใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ล้างทำความสะอาดผักผลไม้ พบว่าการล้างเป็นเวลา 5 นาทีสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *Listeria monocytogenes* ได้ดีที่สุด ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงจัดทำเพื่อทำความเข้มข้นและเวลาในการล้างของน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่เหมาะสมต่อการลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรื่องปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดในผลกาแฟ เช่น كافีโนein และกรดคลอโรจิ尼克 ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากล้างด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์ด้วยเช่นกัน รวมถึงคุณภาพหลังการล้าง

เงิน 1 บรรทัด

Line spacing: Exactly 16 pt

อุปกรณ์และวิธีการ

1. การผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด

นำสารละลายน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มีข้อจำกัดจากการแพร่ไฟฟ้า 13 โวลต์เป็นเวลา 30 นาที จะได้น้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดในฝักข้าวบากซึ่งจะนำไปวัดหาปริมาณความเข้มข้นของคลอรินอิสระด้วยเครื่องวัดปริมาณคลอรีน ได้ความเข้มข้น 300 ppm. pH 3.4 และ ORP +1,200 mV.

2. ผลของน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรดต่อการลดปริมาณจุลินทรีย์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณภาพของผลกาแฟสด

กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า จากตำบลเทพเศศเจ ที่สูกเต็มที่นำมายัดเลือกขนาดที่เท่ากัน แล้วแบ่งผลกาแฟสดออกเป็น 7 ชุดการทดลอง แต่ละชุดประกอบด้วยกาแฟ 500 กรัม จากนั้นนำไปแช่ในน้ำอิเล็กโทรไลต์ 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 50, 100 และ 150 ppm และแต่ละความเข้มข้นแช่เป็นเวลา 15 และ 30 นาที จากนั้นนำผลกาแฟสดที่แช่น้ำอิเล็กโทรไลต์เรียบร้อยแล้วมาผิงให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง และจึงนำไปวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดโดยด้วย compact dry plate (NISSUI, Japan) โดยบ่มที่ 35 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง รายงานผลเป็นหน่วย CFU/g ส่วนการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น كافีโนein และกรดคลอโรจิ尼克 ทำโดยเครื่อง HPLC มี mobile phase ที่ใช้แบบเคลื่อนที่ (gradient) ระหว่าง 0.1% formic acid ในน้ำ (A) และ 0.1% formic acid ใน acetonitrile (B) ดังนี้ โดยเริ่มจาก 95 % (A) และ 5% (B) เป็นเวลา 12.5 นาที จากนั้นคงสัดส่วน 90% (A) และ 10% (B) เป็นเวลา 10 นาที โดยใช้ปริมาตรการฉีดที่ 10 µl มีอัตราการไหลคือ 1 mL/min detector คือ DAD ใช้ความยาวคลื่น 280 nm และ 330 nm ในการวัดปริมาณกาแฟein และกรดคลอโรจิ尼克ตามลำดับ สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพทำการวัดค่าดังนี้คือ การเปลี่ยนแปลงสีผลโดยใช้เครื่อง chroma meter รายงานผลเป็นค่า L* a* b* ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำ (TSS) และปริมาณกรดที่ไห่เกรตได้ (TA) รายงานค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแปรปรวนแบบ one-way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดทดลองโดยวิธี Tukey's test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ แต่ละชุดการทดลองทำ 3 ชั้น

ผลการทดลอง

จากการทดลองน้ำอิเล็กโทรไลต์ต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในผลกาแฟสดพบว่า การล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์ความเข้มข้น 150 ppm เวลา 30 นาที ให้ผลดีที่สุดในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ โดยสามารถลดปริมาณการเจริญของจุลินทรีย์ได้ดีที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.33×10^5 CFU/g รองลงมาคือน้ำอิเล็กโทรไลต์ความเข้มข้น 150 ppm เวลา 15 นาทีพบเชื้อ 4.13×10^5 CFU/g ในขณะที่ชุดควบคุมพบเชื้อจุลินทรีย์เท่ากับ 6.96×10^6 CFU/g ที่ความเข้มข้นของน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่สูงขึ้น มีแนวโน้มว่าจำนวนจุลินทรีย์จะลดลง (Figure 1)

เงิน 1 บรรทัด

Line spacing: Exactly 16 pt

จากการศึกษาคุณภาพของผลกาแฟสด ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS) ปริมาณกรดที่ไหเทรตได้ และการเปลี่ยนแปลงของสีผลกาแฟ พบว่าทุกชุดการทดลองที่ล้างด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้นและเวลาต่างกัน ค่าเฉลี่ยที่ได้มีเม็ดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Table 1) และจากการวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์บางชนิดอย่างเช่น caffeine และกรดคลอโรจินิก พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับน้ำอิเล็กโทรไลต์ โดยเมื่อล้างด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มีความเข้มข้น 150 ppm เป็นเวลา 30 นาที มีปริมาณ caffeine และกรดคลอโรจินิกสูงที่สุด เท่ากับ 2.06 และ 2.27 mg/g ในขณะที่ล้างน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้น 150 ppm เป็นเวลา 15 นาทีพบปริมาณ caffeine และกรดคลอโรจินิกลงมาเท่ากับ 1.99 และ 1.48 mg/g ส่วนชุดควบคุมพบปริมาณสาร caffeine และกรดคลอโรจินิกน้อยสุด เท่ากับ 1.2 และ 0.48 mg/g (Table 1)




Figure 1 The microbial population after being treated with acidic electrolyzed water at 50, 100 and 150 ppm. for 15 and 30 minutes

Table 1 Changes in caffeine, chlorogenic acid, TSS, TA and peel color of coffee cherry after treating with acidic electrolyzed water at 50, 100 and 150 ppm. for 15 and 30 minutes.

Treatment	Chlorogenic acid	Caffeine	TSS	TA	Peel color		
	mg/g	mg/g	(%)	(%)	L*	a*	b*
Control	0.48 d	1.20 d	15.7	0.60	16.39	1.56	1.33
AEW 50 ppm. 15 min.	1.05 bc	1.69 abc	16.9	0.52	16.37	1.86	1.55
AEW 50 ppm. 30 min.	0.82 bc	1.38 cd	15.3	0.62	16.09	2.17	1.67
AEW 100 ppm. 15 min.	0.64 bc	1.46 cd	16.7	0.57	16.17	2.17	1.75
AEW 100 ppm. 30 min.	0.98 c	1.53 bcd	16.4	0.57	16.05	1.48	1.67
AEW 150 ppm. 15 min.	1.48 b	1.99 ab	17.1	0.53	16.58	1.80	1.72
AEW 150 ppm. 30 min.	2.27 a	2.06 a	17.0	0.53	15.95	1.66	1.59

Different letters in a column represent difference according to Turkey's test at $p \leq 0.05$

วิจารณ์ผล

การล้างผลกาแฟสดด้วยน้ำอิเล็กโทรไอล์ต์สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ดี เช่นเดียวกับ Deza *et al.* (2003) ได้ศึกษาถึงผลของการยับยั้งเชื้อ *Escherichia coli* O157:H7, *Salmonella enteritidis* และ *Listeria monocytogenes* ที่อยู่บนผิวของมะเขือเทศโดยใช้น้ำอิเล็กโทรไอล์ต์ล้าง พบร่วมสามารถลดเชื้อแบคทีเรียได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง Whangchai *et al.* (2010) ได้ทำการล้างผลส้มพันธุ์เขียวหวานเป็นเวลา 16 นาที สามารถยับยั้งเชื้อ *Penicillium digitatum* ได้ดีซึ่งประสิทธิภาพการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ขึ้นกับความเข้มข้นและเวลาที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำอิเล็กโทรไอล์ต์กับเชื้อจุลินทรีย์ เนื่องจากน้ำอิเล็กโทรไอล์ต์เป็นสารออกไซด์ มีการแตกตัวให้ hypochlorous hydroxy และ chlorine radical ไปมีผลทำให้เชื้อจุลินทรีย์ถูกทำลายโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์จนเสียสภาพและบางส่วนสามารถเข้าไปในเซลล์ซึ่งผลให้กรดนิวคลีอิกและโปรตีนถูกออกไซด์ ทำให้โครงสร้างเหล่านี้เสื่อมสภาพ จึงทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ (Al-Haq *et al.*, 2005) ส่วนคุณภาพด้านอื่นๆ เช่น ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS) ปริมาณกรดทั้งหมดที่ให้เหตุได้ (TA) และค่าสีของเปลือกกาแฟสด (L^* a^* b^*) ไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างชุดควบคุมและชุดที่ล้างด้วยน้ำอิเล็กโทรไอล์ต์ แสดงให้เห็นว่า การใช้น้ำอิเล็กโทรไอล์ต์นั้นไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลกาแฟสด และจากการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญบางชนิดอย่างคาเพอีนและคลอโรเจนิก พบร่วมเมื่อล้างด้วยน้ำอิเล็กโทรไอล์ต์ส่งผลให้คาเพอีนและกรดคลอโรเจนิกเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการอนุญาติสารในน้ำอิเล็กโทรไอล์ต์ เข้าไปทำให้พิษเกิด oxidative stress โดยสารอนุญาติสารเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบอนุญาติสารของพืชโดยเฉพาะกลุ่มสารประกอบฟินอลิก โดยคาเพอีนและคลอโรเจนิกจัดเป็นสารในกลุ่มสารประกอบฟินอลิกซึ่งทำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อล้างด้วยน้ำอิเล็กโทรไอล์ต์ ซึ่งสอดคล้องกับ Navarro-Rico *et al.* (2014) ทำการล้างตัวอย่างบล็อกโคลีสีดีที่ตัดใหม่ด้วยน้ำอิเล็กโทรไอล์ต์โดยไม่คำนึงถึงค่า pH หรือระดับคลอรินอิสระ พบร่วมปริมาณสารประกอบฟินอลทั้งหมดสูงกว่าตัวอย่างที่ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากคลอรีนถึง 30%

สรุป

การล้างผลกาแฟสดด้วยน้ำอิเล็กโทรไอล์ต์ชนิดกรดที่ความเข้มข้น 150 ppm. เป็นเวลา 30 นาที สามารถการบันปืนปืนของเชื้อจุลินทรีย์ได้มากสุด และสามารถช่วยเพิ่มปริมาณสารคาเพอีนและกรดคลอโรเจนิกได้สูงสุดถึง 1.7 และ 4.7 เท่าตามลำดับ

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการสีรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว และห้องปฏิบัติการการกลาง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีห้องการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำวิจัย และขอบคุณโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2564 สำหรับทุนสนับสนุนในการทำวิจัย

เอกสารอ้างอิง

- Al-Haq, M.I., Y. Seo, S. Oshita and Y. Kawagoe. 2002. Disinfection effects of electrolyzed oxidizing water on suppressing fruit rot of pear caused by *Botryosphaeria berengeriana*. Food Research International 35(7) : 657-664.
- Al-Haq, M.I., J. Sugiyama and S. Isobe. 2005. Applications of electrolyzed water in agriculture & food industries. Food Science and Technology Research 11(2): 135-150.
- Deza, M.A., M. Araujo and J.M. Garido. 2003. Inactivation of *Escherichia coli* O157:H7, *Salmonella enteritidis* and *Listeria monocytogenes* on the surface of tomatoes by neutral electrolyzed water. Letter in Applied Microbiology 37: 482-487.
- Navarro-Rico, J., F. Artes-Hernandez, P.A. Gomez, M.A. Nunez-Sanchez, F. Artes and G.B. Martinez-Hernandez. 2014. Neutral and acidic electrolysed water kept microbial quality and health promoting compounds of fresh-cut broccoli throughout shelf life. Innovative Food Science and Emerging Technologies 21: 74-81.
- Paola, C. L., R.C. Vivian, M. Mercado, M. Deaz and M. Carrascal. 2005. Effectiveness of electrolyzed oxidizing water for inactivating *Listeria monocytogenes* in lettuce. Universitas Scientiarum 10(1): 97-108.
- Whangchai, K., K. Saengnil, C. Singkamanee and J. Uthaibuttra. 2010. Effect of electrolyzed oxidizing water and continuous ozone exposure on the control of *Penicillium digitatum* on tangerine cv. Sai Nam Pung during storage. Crop Protection 29: 386-389.