

15 pt Bold
Line spacing: Exactly 16 pt

1 นิ้ว

ศักยภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดของเปลือกมะละกอ ต่อการควบคุมเชื้อรา
Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง
Potential of Semi-Pure Substance Papaya Peels Crude Extract to Inhibit *Colletotrichum*
gloeosporioides Causing Anthracnose Disease of Mango

12 pt Bold
Line spacing: Exactly 14 pt

จิรวะช โพธิ์อุบล¹ รัตยา พงศ์พิสุทธิธ¹ และ ชัยณรงค์ รัตนกริฑากุล¹
Jiravech Phoubol¹, Ratiya Pongpisutta¹ and Chainarong Rattanakreetakul¹

Abstract

14 pt Bold

This study to show that papaya peels crude extract had effectiveness of inhibiting growth of *Colletotrichum gloeosporioides*, a causal fungal pathogen of mango anthracnose .Papaya peels were extracted by using 95 %ethyl alcohol, then separated into semi-pure substance with column chromatography) CC .(Active ingredients were examined by thin-layer chromatography)TLC(using ethyl acetate: ethanol solvent)ratio1:1 (and tested efficiency using disc agar diffusion method .The result showed 6 fractions separated from semi-pure substance from papaya peels extract were CC01, CC02, CC03, CC04, CC05 and CC06 . Mycelial growth inhibition of *C .gloeosporioides* was assesed on potato dextrose agar)PDA (and found that fractions of CC03, CC05 and CC04 showing width of inhibition zones at 0.850 ,0.735 and 0.725 cm, respectively)LSD=0.140 .(The research keens to represent a potential of papaya peels extract to control mango anthracnose disease, moreover it will be conducted for enhancing plant extract use in order to reduce fungicide chemical to control anthracnose disease for long run.

Keywords: column chromatography, papaya peels extract, mango anthracnose

0.5 นิ้ว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้นำสารสกัดจากเปลือกมะละกอมายับยั้งการเจริญของเชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* ซึ่งเป็นสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง นำเปลือกมะละกมาสกัดด้วย 95 %ethyl alcohol และแยกสารสกัดให้เป็นสารกึ่งบริสุทธิ์ด้วยวิธี column chromatography) CC จากนั้นนำมาทดสอบสารออกฤทธิ์บนแผ่น (thin-layer chromatography)TCL โดยใช้ตัวทำละลายคือ ethyl acetate : ethanol) อัตราส่วน 1:1 (ตรวจสอบประสิทธิภาพของสารที่แยกได้ด้วยวิธี disc agar diffusion method พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะละกอที่ผ่านกระบวนการแยกด้วย CC และให้สารกึ่งบริสุทธิ์จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ CC01, CC02, CC03, CC04, CC05 และ CC06 มีสารกึ่งบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดของเปลือกมะละกอเพียงจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ CC03, CC05 และ CC04 สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา *C .Gloeosporioides* ได้ โดยมี inhibition zone ที่ 0.850 ,0.735 และ 0.725 เซนติเมตร ตามลำดับ) LSD=0.140 (การทดลองนี้สามารถอธิบายถึงประสิทธิภาพของสารที่ได้จากเปลือกมะละกอต่อการนำมาใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้สารสกัด และลดการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสได้ในอนาคต

คำสำคัญ: column chromatography สารสกัดจากเปลือกมะละกอ โรคแอนแทรคโนสมะม่วง

เว้น 1 บรรทัด

Line spacing: Exactly 16 pt

คำนำ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกมะม่วงไปจำหน่ายยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาของการผลิตมะม่วงคือ โรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา *C .gloeosporioides* ซึ่งทำให้ผลเน่าระหว่างการขนส่งและวางจำหน่าย วิธีการควบคุมที่นิยมใช้คือสารเคมี benomyl และ carbendazim แต่เมื่อใช้บ่อยครั้งทำให้เชื้อราเกิดความต้านทานต่อสารเคมีชนิดนั้นได้ การหาแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส โดยหาสารจากธรรมชาติมาใช้ควบคุมโรคแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชจะเป็นการช่วยลดปัญหาสารเคมีตกค้างในสภาพแวดล้อม ในการสกัดสารจากพืชนั้น สารที่ได้จากการสกัดจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรามากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่นำมาใช้สกัด ชนิดของเชื้อรา ความเข้มข้นของสารสกัด และ

10 pt Regular

Line spacing: Exactly 10 pt

¹ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม. 73140

¹ Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140

0.75 นิ้ว

วิธีการสกัด นันทวัน), 2530 (จากการทดลองที่ผ่านมา พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะละกามีประสิทธิภาพสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา *C. gloeosporioides* สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงได้ เมื่อทดสอบโดยวิธี poisoned food บนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar) PDA พบว่าสารสกัดที่มีความเข้มข้น 2,000 ppm ขึ้นไป มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย *C. gloeosporioides* ได้เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ และที่ความเข้มข้น 5,000 ppm มีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ 100 เปอร์เซ็นต์, จิรเวช และคณะ (2559) จากรายงานของ (Raaman) 2015 ทำการวิเคราะห์สารสกัดจากใบมะละกอด้วยวิธี (Thin layer chromatography) TGL โดยใช้ระบบ (ตัวทำละลายคลอโรฟอร์ม เมทานอล โดยมีอัตราส่วน:9 :1 พบแถบที่แยกได้มีค่า R_f 6 แถบ โดยแสงยูวีที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร จากข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมาจึงได้ศึกษาต่อเนื่อง เพื่อยืนยันผลการควบคุมและยับยั้งการเจริญของเชื้อรา *C. gloeosporioides* สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงโดยสารออกฤทธิ์จากเปลือกมะละกอ

อุปกรณ์และวิธีการ

1. ศึกษาการยับยั้งการเจริญของสปอร์เชื้อรา *C. gloeosporioides* ในห้องปฏิบัติการ

การวิเคราะห์และแยกสารตามความสามารถของสารสกัด โดยใช้ Column Chromatography (CC จะได้) fraction ต่างๆ ซึ่งแยกตามความสามารถในการละลาย โดยจะสารสกัดผ่านคอลัมน์ที่บรรจุซิลิกาเจล และใช้สารละลายอินทรีย์ (organic solvent) ในอัตราส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย เอธิลอะซิเตต และเอทานอล นำ fraction ต่างๆ ที่แยกได้ ทำ Bioautography บนแผ่น TLC จากนั้นศึกษาการยับยั้งการเจริญของสปอร์เชื้อรา *C. gloeosporioides* เป็นการทดสอบ ในเบื้องต้น เพื่อหาส่วนของสารสกัดที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราได้ดี โดยนำสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากเปลือกมะละกอ แต่ละ fraction มา spot บน TLC plate หลังจากนั้นจึงพ่นสปอร์เชื้อรา *C. gloeosporioides* โดยใช้ spore suspension 1.35×10^6 spore/ml แล้วบ่มไว้ในสภาพชื้น เป็นเวลา 1-3 วัน ตรวจสอบ zone of inhibition และบันทึกค่า R_f

2. การทดสอบฤทธิ์ของสารกึ่งบริสุทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา

ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา *C. gloeosporioides* ด้วยวิธี disc agar diffusion method เจาะกระดาษกรองรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร และนำไปฆ่าเชื้อ จากนั้นจึงเตรียม fraction ต่าง ๆ ของสารสกัดหยาบจากเปลือกมะละกอ และ ชุดทดลองควบคุม หยดลงบนกระดาษกรองที่เตรียมไว้ ปริมาตร (น้ำกลั่นนิ่งฆ่าเชื้อ) 10 ไมโครลิตร แล้วจึงนำไปวางบนอาหาร PDA ที่ผ่านการ spread plate ด้วยสปอร์ของเชื้อรา *C. gloeosporioides* ปริมาตร 1.35×10^6 spore/ml บ่มเชื้อไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ 24 ชั่วโมง ตรวจสอบและบันทึกผลโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้ง (Inhibition zone)

3. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว

นำผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ มาล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย 2 %Clorox แล้วผึ่งลมให้แห้ง ทำการปลูกเชื้อรา *C. gloeosporioides* ลงบนมะม่วง โดยทำแผลด้วยเข็มหมุดลงไฟ ความลึก 2 มิลลิเมตร นำชิ้นวันเชื้อรา ขนาด 6 มิลลิเมตร วางบนแผล จากนั้นนำผลมะม่วงลงในตะกร้าคลุมถุงพลาสติกปิดผนึก ให้ความชื้นและปิดปากถุงให้สนิท บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง จึงนำชิ้นวันออก ทำการทดสอบการควบคุมโรคโดยแบ่งเป็น 7 กรรมวิธี คือ แผลมะม่วงในสารสกัดจากเปลือกมะละกอ ความเข้มข้น 5,000 ppm, แขน้ำร้อน 52-55 องศาเซลเซียส และนำผลมะม่วงที่บ่มด้วยน้ำเย็นทันที, แผลมะม่วงในสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา difenoconazole ความเข้มข้น 250 ppm, หยดสารละลาย fraction 3, 4 และ 5 ลงบนผลมะม่วง และการทดลองควบคุม นำผลมะม่วงบรรจุใส่ตะกร้าเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยจัดการทดลองแบบ CRD บันทึกผลการทดลองโดยวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแผล ละคำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเกิดโรค โดยใช้สูตร

$$\text{เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง} = \frac{\text{แผลของกรรมวิธีควบคุม} - \text{แผลของกรรมวิธีทดสอบ}}{\text{แผลของกรรมวิธีควบคุม}} \times 100$$

ผล

1. ศึกษาการยับยั้งการเจริญของสปอร์เชื้อรา *C. gloeosporioides* ในห้องปฏิบัติการ

เมื่อวิเคราะห์และแยกสารตามความสามารถการละลายของสารสกัด พบว่า การแยกสารสกัดโดยวิธีการ Column Chromatography ได้ 6 fraction เมื่อทำการทดสอบสารออกฤทธิ์แต่ละส่วนบนแผ่น TLC โดยใช้เชื้อรา *C. gloeosporioides* พบว่า สารออกฤทธิ์ทั้ง 6 fraction สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา *C. gloeosporioides* ได้โดยเกิด zone of inhibition ซึ่ง fraction 1, 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ย $R_f = 0.800$ ส่วน fraction 4, 5 และ 6 มีค่าเฉลี่ย $R_f = 0.670, 0.655$ และ 0.680 ตามลำดับ

2. การทดสอบฤทธิ์ของสารกึ่งบริสุทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา

จากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา *C. gloeosporioides* ด้วยวิธี disc agar diffusion method พบว่า fraction 3 มีขนาดของ inhibition zone กว้างที่สุด คือ 0.850 เซนติเมตร รองลงมาคือ fraction 5 และ 4 มีขนาด inhibition zone เท่ากับ 0.735 และ 0.725 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อเทียบกับชุดทดลองควบคุม และที่หดยดสารสกัดจากเปลือกมะละกอปริมาตร 10 ไมโครลิตร พบว่า ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ (Table 1, Figure 1)

3. ประสิทธิภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว

การทดสอบประสิทธิภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วง หลังการบ่มเชื้อที่ 7 วัน พบว่า fraction 3 มีขนาดแผลเล็กที่สุด คือ 0.980 เซนติเมตร สามารถยับยั้งการพัฒนาด้านของโรคแอนแทรคโนส ได้เท่ากับ 79.794 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ fraction 4 และ difenoconazole โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผลบนผลมะม่วง เท่ากับ 1.615 และ 1.790 เซนติเมตร ตามลำดับ และยับยั้งการพัฒนาด้านของแผล ได้ 66.701 และ 63.093 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับชุดทดลองควบคุม (Table 2, Figure)

วิจารณ์ผลการทดลอง

ผลของการใช้สารกึ่งบริสุทธิ์ที่ได้จากสารสกัดจากเปลือกมะละกอ มีความสามารถในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงที่เกิดจากเชื้อรา *C. gloeosporioides* อาจเป็นเพราะว่าสารบางชนิดในเปลือกมะละกอมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Chavez-Quintal (*et al.* 2011) ซึ่งได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมะละกอและเมล็ด พบว่าสารสกัดจากใบมะละกอสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย *C. gloeosporioides* ได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้สารสกัดจากพืชชนิดอื่นในการควบคุมโรคพืช เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ (ม.ป.ป., ธีระพงษ์ และกานพงษ์) รายงานการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลไม้ โดยการวิเคราะห์ด้วย HPLC พบว่าสารสกัดจากเปลือกมะละกอมี gallic acid, epigallocatechin gallate และ alpha-mangostin เป็นองค์ประกอบ ด้วยเหตุนี้เอง จึงควรมีการศึกษาถึงสารที่มีประสิทธิภาพจากเปลือกมะละกอ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาสำหรับการใช้เป็นสารควบคุมเชื้อรา เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีต่อไป สำหรับงานวิจัยนี้กำลังดำเนินการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากเปลือกมะละกอ อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยครั้งนี้ สารสกัดจากเปลือกมะละกอน่าสนใจที่จะนำมาใช้ เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสเทียบเท่ากับสารเคมีอีกด้วย

Table 1 Test of semi-purification activity in inhibiting fungal growth by using disc agar diffusion method.

Treatment	Inhibition zone (cm) ^{1/}
control	-0.300 d
papaya pericarp extracted	-0.300 d
fraction 1	0.295 c
fraction 2	0.345 c
fraction 3	0.850 a
fraction 4	0.725 a
fraction 5	0.735 a
fraction 6	0.575 b
CV	29.836
LSD	0.141

^{1/}Column values followed by the same letter are not significantly different with (P = 0.05)




Figure 1 Mycelial growth inhibition of *C. gloeosporioides* on PDA with (A) control (B) papaya pericarp extracted (C) fraction 1 (D) fraction 2 (E) fraction 3 (F) fraction 4 (G) fraction 5 and (H) fraction 6

Table 2 Efficiency of crude extracts to control anthracnose on mango fruits after 7d incubation.

Treatment	Lesion Diameter (cm) ^{1/}	Percent of inhibition (%)
control	4.850 a	-
fraction 3	0.980 c	79.794
fraction 4	1.615 bc	66.701
fraction 5	2.170 b	55.258
hot water	2.361 b	51.320
difenoconazole 250 ppm	1.790 bc	63.093
papaya pericarp extracted 5,000 ppm	2.115 b	56.392
cv	47.309	-
LSD	0.959	-

^{1/}Column values followed by the same letter are not significantly different with (P = 0.05)




Figure 2 Control of anthracnose disease on mango fruits in each treatment incubated at room temperature after 7d incubation (A) control (B) fraction 3 (C) fraction 4 (D) fraction 5 (E) hot water (F) difenoconazole 250 ppm and (G) papaya pericarp extracted 5,000 ppm

สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดทั้งสี่ชนิดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา โดยใช้วิธี disc agar diffusion method และประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว พบว่า สารสกัดทั้งสี่ชนิด fraction 3, 4 และ 5 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา *C. gloeosporioides* ได้ทั้งบนอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมทั้งสามารถควบคุมขนาดแผลของการเกิดโรคบนผลมะม่วงได้ เมื่อเทียบกับชุดทดลองควบคุม

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการราวิทยา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ทำการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

- จิระเวช โพธิ์อุบล, รติยา พงศ์พิสุธา และชัยณรงค์ รัตนกริษากุล. 2559. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47 (3 พิเศษ): 91-94.
- ธีระพงษ์ นิลละอ และภาณุพงษ์ ใจวุฒิ. ม.ป.ป. การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลไม้ไทย 6 ชนิด เพื่อเป็นสารยับยั้งไฟโรซิเนส. รายงานผลการวิจัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
- นันทวัน บุญยะประภัสร์. 2530. ก้าวไปกับสมุนไพร. ชรรวมการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
- Chavez-Quintal, P., T. Gonzalez-Flores, I. Rodriguez-Buenfil and S. Gallegos-Tintore. 2011. Antifungal activity in ethanolic extracts of *Carica papaya* L. cv. Maradol leaves and seeds. Indian Journal Microbiology 51: 54-60.
- Raaman N. 2015. Thin Layer Chromatographic Analysis and Antioxidant Activities of Methanol Extract of Leaves of *Carica papaya* L. International Journal of Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry 4: 414-423.

12 pt Regular

Line spacing:

Exactly 13 pt